


Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS) 2012

Paludisme

Un quart des enfants de moins de cinq ans (26 %) ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. Quatre enfants sur dix dans Faranah ont dormi sous une MII, contre 16 % à Conakry. De plus, 28 % des femmes enceintes ont dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. L'utilisation des MII par les femmes enceintes varie de 16 % à Conakry à 39 % dans Kankan.

Utilisation des MII

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et femmes enceintes de 15-49 ans ayant dormi sous une moustiquaire préimprégnée d'insecticide (MII) la nuit précédant l'enquête



Eau

Trois quarts des ménages (75 %) s'approvisionnement en eau auprès d'une source améliorée. La quasi-totalité des ménages à Conakry s'approvisionnent en eau auprès d'une source améliore (99 %), contre 56 % dans Kindia et Mamou.

Source d'eau

Pourcentage des ménages qui s'approvisionnent en eau auprès d'une source améliorée

Boké 70 %
Labé 60 %
Mamou 56 %
Kindia 56 %
Faranah 79 %
Kankan 81 %
Conakry 99 %
N'Zérékoré 81 %
Guinée 75 %

Santé de la mère

Globalement, 40 % des naissances ont eu lieu dans un établissement de santé. C'est dans Mamou que ce pourcentage est le plus faible (19 %) et à Conakry qu'il est le plus élevé (81 %).

Lieu d'accouchement

Pourcentage des naissances au cours des cinq ans ayant précédé l'enquête qui ont eu lieu dans un établissement de santé

Boké 38 %
Labé 27 %
Mamou 19 %
Kindia 36 %
Faranah 29 %
Kankan 40 %
Conakry 81 %
N'Zérékoré 34 %
Guinée 40 %

Assainissement

Moins de deux ménages sur dix (19 %) utilisent des toilettes améliorées non partagées. Seulement 9 % des ménages dans Faranah utilisent des toilettes améliorées non partagées, comparé à 34 % à Conakry.

Assainissement

Pourcentage des ménages qui utilisent des toilettes améliorées, non partagées

Boké 17 %
Labé 21 %
Mamou 21 %
Kindia 17 %
Faranah 9 %
Kankan 11 %
Conakry 34 %
N'Zérékoré 15 %
Guinée 19 %

Nutrition

Deux tiers des ménages disposent du sel iodé. Cette proportion varie de 38 % dans Boké à 87 % dans Kankan.

Plus de trois quarts d'enfants de 6-59 mois sont anémiés. C'est dans Labé que cette proportion est la plus faible (57 %) et dans Faranah qu'elle est la plus élevée (85 %).

Anémie chez les enfants selon la région

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois ayant un niveau d'hémoglobine <11,0 g/dl

